

ПРАДАКСА® капсулы

Дабигатрана этексилат

- Всегда носите эту памятку с собой
- Убедитесь, что используете последнюю версию

(__. __20__)

Уважаемый пациент,

Врач назначил Вам лечение дабигатрана этексилатом (препарат Прадакса®). Для более безопасного использования дабигатрана этексилата (препарат Прадакса®) изучите важную информацию, представленную в этом документе.

Поскольку эта Памятка для пациента содержит важную информацию о Вашем лечении, всегда носите ее с собой для информирования медицинских работников о том, что Вы принимаете дабигатрана этексилат (препарат Прадакса®).

Прадакса®, информация для пациентов**О Вашем лечении**

- Прадакса® разжижает кровь. Препарат применяется для лечения имеющих тромбозов, а также для предотвращения тромбообразования.
- Следуйте указаниям врача при приеме препарата Прадакса®. Никогда не пропускайте и не прекращайте прием препарата Прадакса®, не обсудив со своим врачом.
- Сообщите врачу обо всех препаратах, которые Вы принимаете в настоящее время.
- В случае необходимости хирургического вмешательства или инвазивной процедуры сообщите лечащему врачу, что принимаете препарат Прадакса®.
- Препарат Прадакса® можно принимать независимо от приема пищи. Капсулу следует глотать целиком, запивая стаканом воды, для обеспечения прохождения препарата в желудок. Не ломайте, не разжевывайте и не извлекайте содержимое капсулы.

Когда обращаться к врачу

- Прием препарата Прадакса® может повысить риск кровотечений. Немедленно обратитесь к Вашему лечащему врачу в случае появления следующих симптомов кровотечения: отек, дискомфорт, необычная боль или головная боль, головокружение, бледность, слабость, необычные синяки, носовое кровотечение, кровотечение десен, необычно долгие кровоточащие порезы, необычная менструация или вагинальное кровотечение, кровь в моче, которая может быть розовой или коричневой, красный/черный стул, кашель с кровью, рвота с кровью или кофейной гущей.
- Если Вы упали или поранились во время лечения, особенно в случае травмы головы, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не прекращайте прием препарата Прадакса®, не обсудив со своим врачом, в случае изжоги, тошноты, рвоты, дискомфорта в животе, метеоризма или боли в верхних отделах живота.

Прадакса®, информация для медицинских работников

- Препарат Прадакса® представляет собой антикоагулянт для приема внутрь (прямой ингибитор тромбина).
- При проведении хирургических или других инвазивных процедур необходимо заранее прекратить прием препарата Прадакса®.
- В случае значительных кровотечений необходимо немедленно прекратить прием препарата Прадакса®.
- Для пациентов доступен специфический антагонист (идаруцизумаб). Более подробную информацию и больше рекомендаций по применению антагонистов антикоагулянтного действия препарата Прадакса® см. в Общих характеристиках лекарственных препаратов Прадакса® и идаруцизумаб.
- Препарат Прадакса® выводится, преимущественно, почками; необходимо поддерживать адекватный диурез. Препарат Прадакса® выводится с помощью диализа.

Заполните данный раздел или попросите врача сделать это.

Информация о пациенте

Имя и фамилия пациента _____

Дата рождения _____

Показание к антикоагулянтной терапии _____

Доза препарата Прадакса® _____

В случае развития нежелательного явления следует обращаться по адресу:

ООО "Берингер Ингельхайм"
125171 РФ, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3
Тел: +7(495) 544 5044; 8 800 700 9993; факс: +7 (465)544 5620
E-mail: info.ru@boehringer-ingenlheim.com
www.boehringer-ingenlheim.com